

HIPERPLASIA FIBROSA INFLAMATÓRIA – RELATO DE CASO

MIRANDA, Felipe

FERRI, Cássia de Fátima

PAGLIA, Carolini Gallo

TOMAZI, Karine

DIRSCHNABEL, Acir José

RAMOS, Grasieli de Oliveira

Curso: Odontologia

Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida

A hiperplasia fibrosa inflamatória (HFI) é a denominação dada a lesões proliferativas benignas, surgidas na cavidade bucal a partir de um traumatismo crônico de baixa intensidade. Possui características de aumento volumétrico nodular com caráter fibroso em razão da elevação do número de células da área. Este relato de caso sobre um paciente com HFI visa orientar os cirurgiões-dentistas sobre a necessidade de planejamento prévio e acompanhamento na reabilitação com próteses móveis. Uma paciente do gênero feminino, 62 anos, ASA II, portadora de diabetes mellitus (tipo 2) compensada, compareceu à Clínica de Diagnóstico VI do Curso de Odontologia da Unoesc Joaçaba. Ela relatou dor na região posterior de maxila direita (fundo do vestíbulo) e instabilidade na prótese total superior. Durante o exame físico intrabucal, foi observado um nódulo medindo aproximadamente 1,5 cm, com bordas imprecisas, coloração semelhante à mucosa adjacente, consistência fibrosa e inserção pediculada. Após a realização de exames pré-operatórios, os quais não apresentaram alterações, foi realizada biópsia excisional e ajuste na prótese para evitar a recidiva da lesão. Realizou-se orientação profissional para a paciente diminuir o uso da prótese, principalmente durante o sono, e em relação aos cuidados de higiene bucal. O diagnóstico de HFI foi confirmado por meio do exame histopatológico. O acompanhamento pós-operatório (cicatrização) foi satisfatório (30 dias), e a paciente foi encaminhada para a confecção de uma nova prótese. Concluiu-se que a falta de cuidado com a higiene bucal e o uso da prótese por um período de tempo muito prolongado, sem a substituição, contribuíram para a formação da lesão na mucosa bucal na cavidade. Por isso, o cirurgião-dentista, ao considerar o uso de próteses móveis para pacientes idosos, deve ter um planejamento adequado durante a confecção, sabendo que esses pacientes possuem uma redução do rebordo alveolar, mucosa bucal com menor resiliência e diminuição do fluxo salivar.

Palavras-chave: Hiperplasia. Prótese dentária. Higiene bucal.

felipemiranda.odontologia@gmail.com

acir.dirschnabel@unoesc.edu.br