

# REVISÃO DE LITERATURA: FIBROMA OSSIFICANTE PERIFÉRICO

SANTOS, Antonio Marcos

PASINATO, Joyce

DIRSCHNABEL, Acir José

RAMOS, Grasieli

Curso: Odontologia

Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida

O Fibroma Ossificante Periférico (FOP) é uma lesão proliferativa reacional que ocorre exclusivamente na gengiva, não neoplásica, que tem crescimento gengival lento e pode reaparecer após sua remoção. O objetivo com este trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre o Fibroma Ossificante Periférico. Para isso, foram consultados artigos buscados nas bases de dados Scielo e PUBMED, bem como em livros de patologia. O Fibroma Ossificante Periférico é uma lesão de natureza reacional, e não de natureza neoplásica; apresenta-se como uma massa nodular, séssil ou pediculada, que usualmente se origina da papila interdental. A coloração varia do vermelho ao rosa, e a superfície é geralmente ulcerada. Pesquisadores acreditam que alguns fibromas ossificantes periféricos se desenvolvam inicialmente como granulomas piogênicos, que sofrem maturação fibrosa e subsequente a sua calcificação; por isso, o fibroma é facilmente confundido com o granuloma piogênico. O tecido mineralizado se origina das células do periósteo e do ligamento periodontal, porém nem todos os fibromas ossificantes se desenvolverão dessa maneira. O padrão microscópico básico do fibroma ossificante periférico caracteriza-se pela proliferação de fibroblastos associados a um material mineralizado. Sua etiologia é incerta, mas está associada a fatores irritantes locais; o tratamento de escolha é a excisão cirúrgica local, sempre levando a peça para análise no histopatológico. A recidiva é muito comum nessa lesão, e para evitá-la deve-se remover a lesão até a base, sempre respeitando a margem de segurança. Além disso, os dentes adjacentes devem ser raspados vigorosamente para eliminar qualquer possível irritação. É muito importante que o cirurgião-dentista conheça as características básicas do fibroma ossificante periférico em razão da sua semelhança com o granuloma piogênico, uma lesão bastante frequente na clínica odontológica, possibilitando, então, um correto diagnóstico e tratamento.

Palavras-chave: Fibroma Ossificante Periférico. Diagnóstico.

cdantoniomarcos@gmail.com

grasieli.ramos@unoesc.edu.br