

HIPERPLASIA GENGIVAL INDUZIDA POR FÁRMACOS

USINGER, Rafael

RAMOS, Grasieli de Oliveira

DIRSCHNABEL, Acir José

Curso: Odontologia

Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida

O aumento gengival induzido por fármacos é caracterizado por um crescimento anormal do tecido gengival na região circunjacente à papila interdental. Essa condição ocasiona desconforto ao paciente, uma vez que nos casos mais graves pode recobrir toda a porção coronária do dente. Entre as principais classes de fármacos que causam tal efeito adverso estão os imunossupressores, os anticonvulsivantes e os bloqueadores de canais de cálcio. O objetivo com este trabalho foi descrever, a partir de uma revisão de literatura, as características clínicas da hiperplasia gengival induzida por fármacos (HGF), drogas mais suscetíveis ao aparecimento da HGF, bem como a terapêutica mais indicada para cada caso. Após um a três meses de uso do medicamento, os aumentos originam-se nas papilas interdentais e se espalham pela superfície dos dentes. As áreas mais afetadas são os segmentos vestibulares e anteriores. A extensão lingual ou oclusal dos aumentos pode interferir na fala, na mastigação, no deslocamento lingual e até ocasionar dificuldade respiratória. Em áreas sem inflamação, a gengiva apresenta-se com coloração normal e firme, e superfície variando de lisa, pontilhada ou granular. Já se houver inflamação, a gengiva se torna vermelho-escura, edematosa, sangrante, friável e, ocasionalmente, pode ulcerar. Pacientes que usam ciclosporina também podem apresentar crescimento de tecidos moles, semelhantes a granulomas piogênicos. A fenitoína está mais ligada a pacientes jovens ou associada a bloqueadores de canais de cálcio em pacientes com meia-idade ou idosos. O controle de placa realizado pelo profissional é indicado como primeira opção de tratamento, em conjunto à substituição e/ou adequação da dosagem da droga pelo médico. Entretanto essa resposta à substituição do medicamento não é imediata, por isso recomenda-se um intervalo de 6 a 12 meses antes de uma reavaliação clínica e programação de procedimento cirúrgico (gengivectomia/gengivoplastia).

Palavras-chave: Hiperplasia gengival. Ciclosporina. Fenitoína.

rafaelusinger@hotmail.com

acir.dirschnabel@unoesc.edu.br