

**PREFERÊNCIA ALIMENTAR DE OVINOS ENTRE SILAGEM DE SORGO E SILAGEM DE MILHO COM OU SEM INCLUSÃO DE ESSÊNCIA DE BAUNILHA**

Orientadores: ZOTTI, Claiton André

Pesquisadores: BALDISSERA, Miguel; SANTOS, Andrise Conte dos

Curso: Zootecnia

Área: Ciências da Vida

Resumo: O objetivo foi avaliar a preferência alimentar em ovinos recebendo silagem de milho (SM) e silagem de sorgo (SS) com ou sem a inclusão de essência de baunilha (SMCE ou SSCE). Foram utilizados 8 (oito) cordeiros machos e 4 (quatro) fêmeas, totalizando 12 (doze) animais que foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado. Todos receberam como dieta SM ou SS, além de campo nativo e concentrado. As observações da preferência alimentar foram realizadas em 4 (quatro) dias, durante a alimentação do meio-dia (12:00 h). Os animais apresentaram maior ( $P < 0,0001$ ) preferência pela SM comparado à SMCE, não sendo observada a ingestão da SS com e sem essência. Não houve alteração ( $P = 0,449$ ) no número de acessos aos tratamentos contendo SM e SMCE (3,61; 3,32, respectivamente). O volume de ingestão de matéria seca foi maior ( $P < 0,0001$ ) para o tratamento SM em relação ao SME. Ovinos preferiram dieta à base de silagem de milho sem essência com maior ingestão de matéria seca e tempo de ingestão.

Palavras-chave: Comportamento Ingestivo, Composição Nutricional, Ruminantes.

E-mails: [claiton.zotti@unoesc.edu.br](mailto:claiton.zotti@unoesc.edu.br) / [miguelpagnussatt@hotmail.com](mailto:miguelpagnussatt@hotmail.com)