

DESLOCAMENTO DE ABOMASO - RELATO DE CASO

Pesquisador(es): LUCHTENBERG, J. M. C. ; SILVA, P.V. ; CANDEIA, E. P.; CARDOSO, H.M.

Curso: Medicina Veterinária

Área: Ciências Agrárias.

Resumo: Deslocamento de abomaso é um distúrbio que ocorre principalmente em vacas leiteiras de alta produção. Pode ocorrer também em terneiros, touros, novilhas e bovinos de corte, porém a incidência é menor. Esta afecção ocorre por diversos fatores, sendo eles a queda na ingestão de matéria seca, acetonemia, consumo de dieta com alta ingestão de grão associado a baixa ingestão de fibra efetiva, mudança drástica na dieta, parto gemelar, hipocalcemia, entre outras. O deslocamento de abomaso pode ser a direita ou a esquerda. O deslocamento a esquerda é mais frequente. Essa ectopia está relacionada ao periparto, devido a fatores que levam hipomotilidade ou atonia do órgão que fazem com que ocorra acúmulo de gás e deslocamento. No presente trabalho, foi relatado o caso de uma vaca da raça Holandesa, de aproximadamente 700 kg, que apresentava anorexia, diminuição na produção de leite e havia parido há 3 semanas. Na consulta, foi feita a auscultação com a percussão do flanco esquerdo do animal, sendo ouvido o som metálico ressonante (ping) característico do deslocamento de abomaso. Imediatamente foi realizada a técnica cirúrgica de abomasopexia. A técnica consistiu em uma laparotomia pelo flanco esquerdo, o que permitiu esvaziar o abomaso e fixá-lo na parede ventral do abdômen, reposicionando-o em seu local anatômico. Foi recomendado que o animal ficasse em observação e que sua alimentação fosse controlada, principalmente que tivesse um racionamento no fornecimento de grãos, sendo introduzido aos poucos na dieta.

Palavras-chave: Deslocamento. Abomaso. Abomasopexia.

E-mails: jmclcd@hotmail.com.