

**PROLAPSO VAGINAL GRAU II - RELATO DE CASO**

Pesquisador(es): MARTINS, Dyane; ORO, Camila Isadora; PRATI, Luciana Alves; BALDASSO, Núbia Deconto

Curso: Medicina Veterinária

Área: Ciências da vida

Resumo: O prolapso vaginal consiste na protrusão do tecido vaginal através da vulva e normalmente é visto em cadelas jovens. É classificado em grau I, identificado apenas pela palpação vaginal; grau II, onde há exposição da mucosa vaginal e a cérvix pode ser vista, e grau III, em que há protrusão de toda a circunferência vaginal. As raças mais acometidas são as de grande porte como Fila Brasileiro, Doberman e Boxer. Isso ocorre por uma resposta exagerada da mucosa vaginal ao estrógeno e como consequência, há relaxamento dos ligamentos pélvicos, tumefação e espessamento dessa mucosa, havendo alteração de coloração devido à congestão venosa. O diagnóstico é baseado nos sinais clínicos e histórico reprodutivo da fêmea, confirmado pelo exame clínico e citologia vaginal. Deve haver diagnóstico diferencial de neoplasias e prolapso uterino. Para a resolução permanente, indica-se ovariectomia terapêutica, tendo supressão da fonte de estrógeno. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de prolapso vaginal de grau II, atendido no Hospital Veterinário da Unoesc Xanxerê, no dia 08/03/2018. Um canino fêmea da raça Fila Brasileiro, com 7 meses de idade, com 44,100kg, apresentando a mucosa vaginal exposta, edemaciada, úmida e hiperêmica, com cérvix visível. Para confirmação do diagnóstico foi realizada citologia vaginal, que caracterizou final de proestro e início de estro, fase estrogênica. Como tratamento, foi realizada ovariectomia, havendo boa recuperação por parte do animal.

Palavras-chave: Prolapso vaginal. Fila Brasileiro. Ovariectomia.

E-mails: dyane\_martins@hotmail.com