

TIREOIDITE DE HASHIMOTO E CARCINOMA PAPILÍFERO DA TIREOIDE: UMA CORRELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO

Pesquisador(es): SOUZA, Camille ; BINOTTO, Pietra ; D AGOSTINI, Fernanda; FERNANDES, Liliane; e DEBIASI, Marcelina.

Curso: Medicina

Área: Ciências da vida

Resumo: O carcinoma papilífero da tireoide é a neoplasia mais comum a esta glândula endócrina. A coexistência deste carcinoma à Tireoidite de Hashimoto é uma questão em discussão. Sendo assim, este estudo é uma revisão de literatura, que teve como objetivo discutir casos diagnósticos de carcinomas papilíferos da tireoide e sua coexistência associada ou não à doença autoimune TH. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica dos bancos de dados Pubmed e SciELO, de forma que três foram selecionados. De acordo com a bibliografia analisada, os maiores índices encontrados em pesquisas acerca da correlação dessas patologias entre amostragens de até 466 casos foram de 31,8% no sexo feminino e 20,2% no masculino, podendo ser relacionado o maior número de mulheres à presença dos níveis de estrogênio significativos. Sugere-se que a coexistência de ambas as patologias não é casualidade, visto que o processo inflamatório que ocorre na TH é causador de grande distorção estrutural da glândula, processo que pode vir a contribuir com a ocorrência de uma transformação maligna frente às sucessivas lesões celulares a serem interpretadas pelo organismo. A incidência do tumor é crescente, tendo como mecanismo mais relevante a alteração da RET, posto que é encontrada no tecido tireóideo de pacientes que apresentam doenças inflamatórias crônicas da tireoide, como a TH. Conclui-se então que, dentre o material analisado, existe uma frequência de até 31,8% de relação entre TH e CPT, o que sugere uma associação não somente casual, mas uma relação de causa e efeito entre as patologias.

Palavras-chave: Tireoidite. Hashimoto. Carcinoma

E-mails: camillesouza045@gmail.com/ pietrabinotto@gmail.com

<https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/siepe>

