

## DESLOCAMENTO DE ABOMASO À ESQUERDA

Pesquisador(es): SANGUANINI, Gabriela; BERTIPAGLIA, Tássia Souza; GOMES, Fabio Jose

Curso: Medicina Veterinária

Área: Ciência Agrária

Resumo: O deslocamento de abomaso à esquerda (DAE) é uma patologia muito frequente sendo responsável por grandes perdas econômicas devido à queda de produtividade e de rendimento, além de gastos com medicamentos e intervenções cirúrgicas, seu diagnóstico tornou-se rotina clínica em animais de produção. Essa revisão tem como objetivo avaliar a prevalência de deslocamento de abomaso à esquerda em bovinos leiteiros alimentados com dietas ricas em grãos. A maior incidência de DAE ocorre no período de duas a oito semanas após o parto, principalmente nas épocas de pouco oferta de forragem. Nesta época, a relação volumoso-concentrado é reduzida, ou seja, há maior proporção de grãos nas dietas. Os grãos apresentam fermentação rápida e se ingeridos em grandes quantidades acabam induzindo a produção excessiva de gases, além de reduzirem a motilidade abomasal. Desta forma, os gases farão com que o abomaso saia do assoalho da cavidade abdominal de forma “flutuante”, seguindo no sentido dorsal do animal. O prognóstico dessa patologia é favorável desde que seja diagnosticada e tratada da forma correta. O diagnóstico baseia-se na percussão e auscultação simultânea que identificam sons metálicos, mas que dependem da localização e da quantidade de gás presente no órgão. O tratamento baseia-se na correção cirúrgica, em que o objetivo é realocar o abomaso em sua posição fisiológica, afim de normalizar a função digestiva. É de suma importância a avaliação clínica minuciosa do paciente, afim de evitar erros de diagnóstico e tratamento, pois é uma patologia que apresenta sinais clínicos inespecíficos.

Palavras-chave: Abomaso. Bovinos Leiteiros. Grãos.

E-mails: [sanguaninigabriela@gmail.com](mailto:sanguaninigabriela@gmail.com)

