



FATORES DE RISCO PARA A OCORRÊNCIA DA PARALISIA OBSTÉTRICA DO PLEXO BRAQUIAL

Pesquisador(es): NEUHAUSER, Janaína; GUERRA, Maria Fernanda Giacomin; OLIVEIRA, Bruna Almeida; BORONI, Georgina Gomes e Souza Munaier; COLFERAI, Willian; BOSCO, Guilherme Serpa; ZOLDAN, Rosangela.

Curso: Medicina

Área: Ciências da Vida e Saúde

Resumo: A paralisia obstétrica do plexo braquial caracteriza-se como uma lesão parcial ou total do plexo braquial, advinda de complicações no momento do parto. Tal lesão, que comumente envolve o estiramento dos troncos nervosos do plexo, tende a comprometer a mobilidade dos membros superiores. Dessarte, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica sobre os principais fatores de risco na ocorrência da paralisia obstétrica do plexo braquial, visto a importância de tais informações ao processo preventivo e diagnóstico. A partir de pesquisa em plataformas digitais como Scielo e EBSCO, com os descritores paralisia obstétrica do plexo braquial e plexo braquial, foram angariados artigos publicados entre 2010 e 2018. Como resultado do estudo, inferiu-se que os principais fatores para a ocorrência da paralisia são a macrosomia fetal e a distócia dos ombros. Apesar de não figurarem como fatores primordiais, obesidade materna, baixa estatura da mãe e trabalho de parto prolongado surgem como agentes significativos. Em suma, há necessidade de prosseguir com estudos expondo as variadas características que predisõem a paralisia obstétrica. Pelo fato desta comorbidade possuir riscos variados, torna-se imprescindível ao profissional da saúde dispor de informações sólidas para a coleta de sintomas clínicos, visando proporcionar uma melhor abordagem preventiva e diagnóstica, além de perspectivas de um tratamento efetivo.

Palavras-chave: Paralisia. Obstétrica. Plexo.

E-mails: jananeu@hotmail.com, bruna221oliveira@gmail.com.