

## DISTÚRBIOS MICCIONAIS EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON

Maria Eduarda Lucion<sup>1</sup>, Viviane Jacintha Bolfe Azzi<sup>2</sup>

1. Discente do curso de graduação em Fisioterapia, Unoesc, São Miguel do Oeste, SC
2. Docente do curso de graduação em Fisioterapia, Unoesc, São Miguel do Oeste, SC

**Autor correspondente:** Maria Eduarda Lucion, lucionmariaeduarda@gmail.com

**Área:** Ciências da Vida e Saúde

**Introdução:** Indivíduos com Doença de Parkinson (DP) frequentemente são identificados pelos tremores e alterações na marcha. Contudo tal doença também desencadeia alterações urinárias graves, que afetam a funcionalidade do portador. **Objetivo:** Investigar a presença de distúrbios miccionais referidos pelos indivíduos com DP. **Método:** Trata-se de um estudo observacional transversal, que reuniu doze indivíduos com DP atendidos em uma Clínica Escola de Fisioterapia. Os participantes responderam a um questionário sobre características biodemográficas, início dos sintomas e tratamentos realizados. Em seguida foram aplicados os questionários Escala de Sintomas da Associação Urológica Americana (AUA-7), International Consultation on Incontinence Questionnaire Overactive Bladder (ICIQ- OAB), International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form (ICIQ-SF) para investigação dos distúrbios miccionais e a escala Hohen e Yahr para avaliar o comprometimento e o estágio de evolução da DP. Os dados foram analisados por frequência absoluta e relativa e aplicado coeficiente de correlação de Spearman, considerando  $p < 0.05$ . **Resultados:** A presença de distúrbios miccionais foi referida por 100% dos participantes. Constatou-se correlação entre AUA-7 e ICIQ-OAB ( $r_s = 0,57$  e  $p = 0,04$ ), AUA-7 e ICIQ-SF ( $r_s = 0,73$  e  $p = 0,006$ ) e entre ICIQ-OAB e ICIQ-SF ( $r_s = 0,79$  e  $p = 0,002$ ), mas não houve correlação significativa entre o escore dos questionários e as demais variáveis analisadas (idade, tempo de diagnóstico e classificação na escala Hohen e Yahr). **Conclusão:** Distúrbios miccionais foram referidos por todos os indivíduos com DP avaliados, assim como encontrado na literatura. Idade, tempo de diagnóstico da doença e estágio da doença não estão relacionados aos sintomas miccionais. Dessa forma, incita-se a necessidade de realizar mais pesquisas nessa área, para ter maiores comparações no embasamento teórico. No presente estudo, por se tratar de amostra da ocasião, com pequeno número de participantes, não foi possível extrapolar os resultados obtidos e atribuir as correlações associativas um caráter de efeito preditor de um parâmetro em relação ao outro.

**Palavras-chave:** Distúrbio Miccional; Doença de Parkinson; Incontinência Urinária.

**Agradecimentos:** A autora Maria Eduarda Lucion agradece ao Programa de Bolsas Universitárias do Estado de Santa Catarina (UNIEDU) pela concessão de bolsa de iniciação científica.