

DIFICULDADES NO DESENVOLVIMENTO DA MOTRICIDADE OROFACIAL EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO NARRATIVA.

Emile Bolzan da Rosa¹, Joana Maria Paganini², Janaina Ferreira dos Santos³

1. Discente do curso de graduação em Fonoaudiologia, Unoesc, Joaçaba, SC
2. Discente do curso de graduação em Fonoaudiologia, Unoesc, Joaçaba, SC
3. Docente do curso de graduação em Fonoaudiologia, Unoesc, Joaçaba, SC

Autor correspondente: Emile Bolzan da Rosa, emilebolzan@gmail.com

Área: Ciências da Vida e Saúde

Introdução: A predominância das alterações existentes na motricidade orofacial em crianças associa-se a hábitos orais como o uso de mamadeira, chupeta e sucção não nutritiva, incluindo a alimentação de consistência pastosa, o que faz com que a motricidade orofacial seja uma das principais demandas fonoaudiológicas atuais. **Objetivo:** Este estudo visa compreender as dificuldades de desenvolvimento da motricidade oral infantil, e conhecer as condutas fonoaudiológicas que podem auxiliar neste desenvolvimento. **Método:** A revisão baseou-se em dados das plataformas Google Acadêmico e SciELO, onde foram encontrados 9 artigos científicos e 4 foram selecionados, através da combinação de palavras-chave "Crianças", "Dificuldade de desenvolvimento em Motricidade Orofacial", "Fonoaudiologia", "Tratamento Fonoaudiológico" e "Motricidade Orofacial". **Resultados:** Atualmente, muitas crianças enfrentam dificuldade de motricidade orofacial, o que reflete na capacidade de fala e dicção das mesmas ao decorrer da vida. Isso se deve a alterações funcionais na região orofacial e cervical, o que geralmente é um impacto gerado na infância, período crítico para aprender a controlar funções como a respiração, mastigação, sucção e deglutição. Um estudo realizado em uma Clínica Escola de Fonoaudiologia conveniada ao SUS, estima que 35.5% do total de 53.3% de crianças possuíam problemas de motricidade orofacial, e a maioria dos casos foram tratados através de estímulos e reabilitação. Algumas das dificuldades que impactam a motricidade orofacial em crianças é a sucção inadequada, muitas vezes através do uso de chupeta ou posição incorreta na amamentação, mastigação incorreta, onde algumas crianças começam a mastigar apenas de um lado e os músculos do outro lado passam a atrofiar ou doer, fala distorcida, é a forma mais clara de observar que existe alguma alteração orofacial, podendo ser em algum músculo, nervo ou disfunção temporomandibular, que se trata do transtorno na ATM. **Conclusão:** O aumento dos casos de dificuldades no desenvolvimento da motricidade orofacial em crianças reforça a necessidade crescente de uma abordagem multissetorial, envolvendo profissionais da fonoaudiologia, odontologia e psicologia. O sucesso do tratamento depende de um diagnóstico preciso, além do apoio familiar e do estado psicológico da criança, sendo necessário orientar os responsáveis com clareza visando o melhor desenvolvimento do paciente.

Palavras-chave: Crianças ; Dificuldades de desenvolvimento em Motricidade Orofacial; Fonoaudiologia; Motricidade Orofacial.